

Grupo	Subgrupo	Referencia rápida	Hallazgos específicos
A		Tumor pequeño	Retinoblastoma </3 mm en tamaño.
		Tumor mayor	Retinoblastoma >/3 mm en tamaño ó:
		Mácula	Localización de retinoblastoma en mácula (</ 3 mm de fovea).
		Yuxtapapilar	Localización de retinoblastoma yuxtapapilar (</ 1.5 mm de disco).
		Líquido subretiniano	Líquido claro subretiniano </3 mm del margen.
C	C1	Siembras localizadas	Retinoblastoma con siembras subretinianas </ 3 mm.
	C2	Siembras localizadas	Retinoblastoma con siembras vítreas </ 3 mm.
	C3	Siembras localizadas	Tanto siembras subretinianas como vítreas </ 3 mm.
D	D1	Siembras difusas	Retinoblastoma con siembras subretinianas >3 mm.
	D2	Siembras difusas	Retinoblastoma con siembras vítreas >3 mm.
	D3	Siembras difusas	Tanto siembras subretinianas como vítreas >3 mm.
E	Retinoblastoma extenso		• Extenso retinoblastoma que ocupa >50% de la cavidad vítrea ó -Glaucoma neovascular, medio opaco proveniente de hemorragia de cámara anterior, vítreo o espacio subretiniano ó • Invasión post laminar del nervio óptico. • Invasión a coroides >2 mm, esclera, órbita o cámara anterior.

Fuente: Kaliki S, Shields CL, Rojanaporn D, et al.: High-risk retinoblastoma based on international classification of retinoblastoma: analysis of 519 enucleated eyes. Ophthalmology 120 (5): 997-1003, 2013.